



Comune di FOMBIO Provincia di Lodi

STUDIO DELLA COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12
D.G.R. 22 dicembre 2005, n. 8/1566

CARTA DI SINTESI

TAVOLA: 7 Data: Aprile 2008

Scala 1: 10.000

dott. Marco Dagutati
GEOLOGO

Via A. Diaz, 22 - Codogno (LO)
Tel. e fax 0377.433021 - portatile 335.6785021
e-mail: marco.daguati@geolambda.it

LEGENDA

ELEMENTI IDROGRAFICI E GEOMORFOLOGICI

Reticolo idrografico

Rilevato arginale


Scarpate morfologiche principali

ABEE VIII. NEERADIL DAL PUNTO DI VISTA IDROGEOLOGICO


Digitized by srujanika@gmail.com



Digitized by srujanika@gmail.com



Pozzo acquedottistico e relative fasce di tutela assoluta
e di riserva (D.Lgs. 152/06)



CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO PER AREE OMOGENEE

Fascia di esondazione del Colatore Mortizza

Aree interessate da rimodellamento morfologico per riporto di materiale inerte

1. Depositi sabbiosi, limosi e argillosi con una frequente componente organica.
2. Acquifero subaffiorante in condizioni di vulnerabilità elevata.

1. Sabbie e sabbie limose con locali coperture fini
2. Acquifero da confinato-semiconfinato (in condizioni di vulnerabilita' da bassa a moderata) a libero (vulnerabilita' alta).
3. Soggiacenza della falda $S > 10$ m

1. Depositi prevalentemente sabbiosi con locali coperture di natura limosa o argillosa (piu' frequenti in corrispondenza dei paleovalvi)
2. Acquifero da libero a localmente confinato in condizioni di vulnerabilita' da alta a elevata.
3. Soggiacenza della falda $S < 2$ m (a) o $2 \text{ m} < S < 5$ m (b).

1. Depositi prevalentemente sabbiosi con locali coperture di natura limosa o argillosa (piu' frequenti in corrispondenza dei paleovalvi)
2. Acquifero da libero a localmente confinato in condizioni di vulnerabilita' da alta a elevata.
3. Soggiacenza della falda $S < 2$ m (a) o $2 \text{ m} < S < 5$ m (b).

